

saletra magnezowa

Wpisany przez Administrator
wtorek, 07 grudnia 2010 15:54 - Poprawiony wtorek, 12 kwietnia 2011 15:40

Producent : ZAKŁADY CHEMICZNE ?ALWERNIA? S.A.

32-566 Alwernia, ul. K. Olszewskiego 25

Konfekcjoner : AGROMIRES, ul. Ziołowa 4, 42-165 Lipie , tel. 605 697 086

www.agromires.pl

NAWÓZ MINERALNY

SALETRA MAGNEZOWA SZEŚCIOWODNA

$Mg(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$

Nawożenie dolistne

Dolistne nawożenie saletrą magnezową jest zalecane w przypadku jednoczesnego wystąpienia na roślinach uprawnych niedoborów magnezu i azotu i pozwala na szybkie usunięcie niedoborów powyższych składników odżywczych. W przypadku wystąpienia tylko niedoborów magnezu bardziej wskazany jest oprysk roztworem siarczanem magnezu, który odznacza się słabszymi własnościami parzącymi tkanki roślinne. Interwencyjne nawożenie dolistne najważniejszych upraw prowadzić łącznie z zgodnie z tabelą 4. Opryski można łączyć z roztworem mocznika o stężeniu 2-5%. Nie przekraczać zalecanych dawek!

saletra magnezowa

Wpisany przez Administrator

wtorek, 07 grudnia 2010 15:54 - Poprawiony wtorek, 12 kwietnia 2011 15:40

Tabela 4. Zalecenia do dolistnego dokarmiania upraw saletrą magnezową

Uprawy

Dawka nawozu stałego kg, (ilość cieczy) litry/ ha

Stężenie cieczy do oprysku, % wag

Termin i ilość zabiegów, uwagi

drzewa i krzewy owocowe

4-6

(500-1000)

0,6-1,2 %

saletra magnezowa

Wpisany przez Administrator
wtorek, 07 grudnia 2010 15:54 - Poprawiony wtorek, 12 kwietnia 2011 15:40

po stwierdzeniu niedoborów magnezu i azotu 2 -3 opryski co 4-5 dni

truskawki

3-4

(300-400)

0,6-1.0 %

po stwierdzeniu niedoborów magnezu i azotu 2 -3 opryski co 4-5 dni

pomidory pod osłonami

1-2

(300-400)

0,2-0.5%

po stwierdzeniu niedoborów magnezu i azotu 2 -3 opryski co 3-4 dni

saletra magnezowa

Wpisany przez Administrator
wtorek, 07 grudnia 2010 15:54 - Poprawiony wtorek, 12 kwietnia 2011 15:40

ppomidory w polu

□

2-3

(300-400)

0,5-0.8 %

po stwierdzeniu niedoborów magnezu 2 -3 opryski co 3-4 dni

zboża, użytki zielone, kukurydza

4 ?6

(300-400)

0,6-1.0%

od fazy krzewienie przy objawach niedoboru magnezu i azotu 2-3 opryski co 4-5 dni

saletra magnezowa

Wpisany przez Administrator
wtorek, 07 grudnia 2010 15:54 - Poprawiony wtorek, 12 kwietnia 2011 15:40

rzepak buraki

1-2

(300-400)

0,4-0,5%

po ruszeniu wegetacji, 2-3 opryski co 7-10 dni

faza 8-10 liści, następne co 3 tyg. 2-3 opryski

ziemniaki tytoń

1-2

(300-400)

0,4-0,5%

przed zwarciem międzyrzędzi 2-3 opryski

od fazy 4-6 liści, co 7-10 dni, 2-3 opryski

saletra magnezowa

Wpisany przez Administrator

wtorek, 07 grudnia 2010 15:54 - Poprawiony wtorek, 12 kwietnia 2011 15:40

UWAGA: Opryski należy wykonywać wcześniej rano lub wieczorem, stosować oprysk średniokroplisty

Masa netto: 5 ± 0,1 kg □ □ □ □ □ □ 25 kg ± 0,1 kg